

ผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มนักเรียน

ชั้น ปวช ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อมูลทั่วไป

การเฝ้าระวังในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ดำเนินการเก็บข้อมูลในกลุ่มนักเรียนชั้นปวช ๒ จำนวน ๓๖๒ คน เป็นเพศชาย ๑๙๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๔๘ เพศหญิง ๑๗๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๕๑ อายุเฉลี่ย ๑๗.๐๘ ปี

ประสบการณ์ทางเพศ

นักเรียนชายชั้น ปวช ๒ จำนวน ๕๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๙ และนักเรียนหญิงจำนวน ๕๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๔ เคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว อายุเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก เพศชาย ๑๕.๔๙ ปี เพศหญิง ๑๖.๐๔ ปี การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก เพศชายร้อยละ ๕.๓ เพศหญิงร้อยละ ๒.๓ ของนักเรียนที่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว

ประสบการณ์ทางเพศในรอบปีที่ผ่านมา

ในรอบปีที่ผ่านมา นักเรียนชายมีเพศสัมพันธ์ร้อยละ ๒๓.๒ ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด ร้อยละ ๗๑.๗ ของนักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์ นักเรียนหญิงมีเพศสัมพันธ์ร้อยละ ๓๐.๒ ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด ร้อยละ ๗๒.๒ ของนักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์

ประสบการณ์ทางเพศในรอบปีที่ผ่านมา	ชาย	หญิง
มีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา	23.2%	30.2%
ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด	71.7%	72.2%
มีเพศสัมพันธ์และดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด	4.7%	16.7%
มีเพศสัมพันธ์และใช้สารเสพติด ก่อนมีเพศสัมพันธ์	2.1%	1.2%
มีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับเงินหรือสิ่งของ	1.1%	0.6%

ประสบการณ์ทางเพศในรอบปีที่ผ่านมา แยกคู่นอน	ชาย	หญิง
มีเพศสัมพันธ์กับหญิงขายบริการ	9.4%	0%
ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง	5.7%	0%
ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด	7.5%	0%
มีเพศสัมพันธ์กับแฟนหรือคนรัก	34%	37%
ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง	15.1%	14.8%
ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด	28.3%	25.9%
มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย	5.7%	0%
ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง	1.9%	0%
ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด	3.8%	0%

วิธีการป้องกันการตั้งครรภ์

นักเรียนชายส่วนใหญ่ใช้วิธีป้องกันการตั้งครรภ์ โดยการใช้ถุงยางอนามัยชาย ร้อยละ 72.7 นักเรียนหญิงส่วนใหญ่ใช้วิธีป้องกันการตั้งครรภ์ คือ ถุงยางอนามัยชาย ร้อยละ 61.5

วิธีการป้องกันการตั้งครรภ์	ชาย	หญิง
ใช้ถุงยางอนามัยชาย (FPLAN_A)	72.7%	61.5%
ใช้ถุงอนามัยสตรี (FPLAN_B)	0%	0%
ใช้ยาฉีดคุมกำเนิด (FPLAN_C)	6.8%	7.7%
ใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด (FPLAN_D)	11.4%	15.4%
ใช้ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน(FPLAN_E)	18.2%	26.9%
นับระยะปลอดภัย(FPLAN_F)	4.5%	11.5%
หลั่งภายนอก(FPLAN_G)	6.8%	21.2%

พฤติกรรมการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ในรอบปีที่ผ่านมา นักเรียนชายมีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มากที่สุด คือมีมีอาการ ปัสสาวะแสบขัด มีของเหลวที่ผิดปกติไหลออกจากอวัยวะเพศ มีหนองไหลออกจากอวัยวะเพศ และมีแผลที่ ทวารหนัก ร้อยละ 2.1 เท่ากัน นักเรียนหญิงมีอาการปัสสาวะแสบขัด และมีของเหลวที่ผิดปกติไหลออกจาก อวัยวะเพศ ร้อยละ 5.8 เท่ากัน

นักเรียนส่วนใหญ่ไปรักษาโรงพยาบาล/คลินิกตรวจโรคทั่วไปของรัฐ

อาการทางเพศสัมพันธ์	ชาย	หญิง
มีอาการปัสสาวะแสบขัด	2.1%	5.8%
มีของเหลวที่ผิดปกติไหลออกจากอวัยวะเพศ	1.1%	1.7%
มีหนองไหลออกจากอวัยวะเพศ	1.1%	0.6%
มีหนองไหลออกจากทวารหนัก	0%	0.6%
แผลที่อวัยวะเพศ	0.5%	0.6%
แผลที่ทวารหนัก	0%	0%
มีตุ่ม/ก้อน/หูดที่อวัยวะเพศ	0%	0.6%
มีตุ่ม/ก้อน/หูดที่ทวารหนัก	0.5%	0.6%

การรักษา	ชาย	หญิง
ไปโรงพยาบาล/คลินิกตรวจโรคทั่วไปของรัฐ	1.1%	3.5%
ไปโรงพยาบาล/คลินิกตรวจโรคทั่วไปของเอกชน	0.5%	0%
ไปคลินิกกามโรคของเอกชน	0.5%	0.6%
ไปคลินิกกามโรคของรัฐ	0.5%	0%
ไปพบ พยาบาลประจำโรงเรียน	0%	0%
ซื้อยากินเอง	0%	1.7%
ปล่อยไว้ไม่ทำอะไรเลย	0.5%	2.3%

การตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี/เอดส์

นักเรียนชายที่เคยเจาะเลือดตรวจหาเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ร้อยละ ๘.๔ รู้ผลการตรวจเลือดร้อยละ ๖.๓
 นักเรียนหญิงที่เคยเจาะเลือดตรวจหาเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ร้อยละ ๒ รู้ผลการตรวจเลือดร้อยละ ๐.๖

การตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี/เอดส์	ชาย	หญิง
เคยตรวจเลือด (yvct)	8.4%	2.%
การตรวจเลือดและรับรู้ผลในรอบปี (KNVCT)	6.3%	0.6%

การตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคเอดส์ได้ถูกต้องของนักเรียน

ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์

คำถามความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ พบว่าคำถามข้อที่นักเรียนชายตอบถูกน้อยที่สุด คือ “คนที่ดูสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีมีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้” ตอบถูกเพียงร้อยละ 23.7 ข้อคำถามที่ตอบถูกมากที่สุด คือ “การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งขณะมีเพศสัมพันธ์ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้” ตอบถูกมากถึงร้อยละ 96.8

คำถามที่นักเรียนหญิงตอบถูกน้อยที่สุดคือ “คนที่ดูสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีมีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้” ตอบถูกเพียงร้อยละ 22.1 คำถามที่ตอบถูกมากที่สุด คือ “การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งขณะมีเพศสัมพันธ์ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้” ตอบถูกมากถึงร้อยละ 93.6

ความรู้และความตระหนักเรื่องโรคเอดส์ตามตัวชี้วัด GARPR 5 ข้อ พบว่านักเรียนชายตอบถูกทั้ง 5 ข้อ ร้อยละ 23.7 ส่วนนักเรียนหญิงตอบถูกต้องทั้ง 5 ข้อ ร้อยละ 12.8

คำถาม	ชาย	หญิง
1.การมีคู่นอนเพียงคนเดียวที่เป็นผู้ไม่มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์และไม่มีคู่นอนคนอื่นลดเสี่ยง ในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้	81.1%	87.8%
2.การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งขณะมีเพศสัมพันธ์ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้	96.8%	93.6%
3.คนที่ดูสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีมีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้	23.7%	22.1%
4.คนติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้จากการถูกยุงกัด	76.3%	77.9%
5.คนติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้จากการกินอาหารร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์	51.6%	34.3%
6.โรคเอดส์เป็นแล้วรักษาให้หายขาดได้	72.1%	58.1%
7.ยาคุมฉุกเฉินใช้ป้องกันโรคเอดส์ได้	91.6%	90.1%
8.โรคเอดส์สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน	48.4%	50.6%
9.การล้างอวัยวะเพศหลังจากการมีเพศสัมพันธ์ป้องกันการติดเชื้อเอดส์ได้	53.7%	48.3%
ตอบข้อที่1 – 5 ได้ถูกต้อง	23.7%	12.8%
ตอบข้อที่1 – 9 ได้ถูกต้อง	10%	1.7%

