

ผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อมูลทั่วไป

การเฝ้าระวังในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ดำเนินการเก็บข้อมูลในกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๑,๒๗๗ คน เป็นเพศชาย ๕๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๘ เพศหญิง ๗๔๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๒ อายุเฉลี่ย ๑๓.๘ ปี

ประสบการณ์ทางเพศ

นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๘ และนักเรียนหญิงจำนวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๒ เคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว อายุเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก ๑๓.๔๗ ปี การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก เพศชายร้อยละ ๑.๗ เพศหญิงร้อยละ ๐.๘ ของนักเรียนที่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว

ประสบการณ์ทางเพศในรอบปีที่ผ่านมา

นักเรียนชายมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมาร้อยละ ๑.๗ ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดร้อยละ ๓๓.๓

นักเรียนหญิงมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมาร้อยละ ๐.๙ ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดร้อยละ ๔๔.๔

ประสบการณ์ทางเพศในรอบปีที่ผ่านมา	ชาย	หญิง
มีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา	1.7%	0.9%
ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด	33.3%	44.4%
มีเพศสัมพันธ์และดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด	0.4%	0%
มีเพศสัมพันธ์และใช้สารเสพติด ก่อนมีเพศสัมพันธ์	0.4%	0.1%
มีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับเงินหรือสิ่งของ	0.2%	0%

ประสบการณ์ทางเพศในรอบปีที่ผ่านมา แยกคู่นอน	ชาย	หญิง
มีเพศสัมพันธ์กับหญิงขายบริการ	6.7%	0%
ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง	0%	0%
ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด	0%	0%
มีเพศสัมพันธ์กับแฟนหรือคนรัก	26.7%	22.2%
ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง	20%	22.2%
ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด	20%	22.2%
มีเพศสัมพันธ์กับผู้ขาย	0%	0%
ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง	0%	0%
ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด	0%	0%

วิธีการป้องกันการตั้งครรภ์

นักเรียนชายส่วนใหญ่ใช้วิธีป้องกันการตั้งครรภ์ โดยการใช้ถุงยางอนามัยชาย ร้อยละ 77.8 นักเรียนหญิง

การป้องกันการตั้งครรภ์	ชาย	หญิง
ใช้ถุงยางอนามัยชาย	77.8%	57.1%
ใช้ถุงอนามัยสตรี	0%	0%
ใช้ยาฉีดคุมกำเนิด	0%	0%
ใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด	0%	14.3%
ใช้ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน	0%	0%
นั้บระยะปลอดภัย	0%	0%
หลั่งภายนอก	0%	0%

ส่วนใหญ่ใช้วิธีป้องกันการตั้งครรภ์ คือ ถุงยางอนามัยชาย ร้อยละ 57.1 ใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด ร้อยละ 14.3

พฤติกรรมการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ในรอบปีที่ผ่านมา นักเรียนชายมีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มากที่สุด คือมีอาการปัสสาวะแสบขัดร้อยละ 3.9 รองลงมา มีของเหลวที่ผิดปกติไหลออกจากอวัยวะเพศร้อยละ 2.1 ส่วนนักเรียนหญิงมีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มากที่สุด คือ มีอาการปัสสาวะแสบขัดร้อยละ 3 รองลงมา มีของเหลวที่ผิดปกติไหลออกจากอวัยวะเพศร้อยละ 1.3

อาการทางเพศสัมพันธ์	ชาย	หญิง
มีอาการปัสสาวะแสบขัด	3.9%	3%
มีของเหลวที่ผิดปกติไหลออกจากอวัยวะเพศ	2.1%	1.3%
มีหนองไหลออกจากอวัยวะเพศ	0.2%	0.5%
มีหนองไหลออกจากทวารหนัก	0.2%	0%
แผลที่อวัยวะเพศ	0.9%	1.1%
แผลที่ทวารหนัก	0.4%	0.3%
มีตุ่ม/ก้อน/หูดที่อวัยวะเพศ	0.4%	0.7%
มีตุ่ม/ก้อน/หูดที่ทวารหนัก	0.2%	0.1%

นักเรียนส่วนใหญ่ไปโรงพยาบาล/คลินิกตรวจโรคทั่วไปของรัฐ นักเรียนชายร้อยละ 3.2 นักเรียนหญิงร้อยละ 3.1

การรักษา	ชาย	หญิง
ไปโรงพยาบาล/คลินิกตรวจโรคทั่วไปของรัฐ	3.2%	3.1%
ไปโรงพยาบาล/คลินิกตรวจโรคทั่วไปของเอกชน	1.9%	2%
ไปคลินิกกามโรคของเอกชน	0.6%	0%
ไปคลินิกกามโรคของรัฐ	0.2%	0.1%
ไปพบ พยาบาลประจำโรงเรียน	0%	0.1%
ซื้อยากินเอง	1.7%	0.1%
ปล่อยไว้ไม่ทำอะไรเลย	0.7%	0.7%

การตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี/เอดส์

นักเรียนชายที่เคยเจาะเลือดตรวจหาเชื้อเอชไอวี/เอดส์ร้อยละ 3.4 รู้ผลการตรวจเลือดร้อยละ ๑.๓
นักเรียนหญิงที่เคยเจาะเลือดตรวจหาเชื้อเอชไอวี/เอดส์ร้อยละ ๑.๗ รู้ผลการตรวจเลือดร้อยละ ๐.๙

การตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี/เอดส์	ชาย	หญิง
เคยตรวจเลือด (yvct)	3.4%	1.3%
การตรวจเลือดและรับรู้ผลในรอบปี (KNVCT)	1.7%	0.9%

การตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคเอดส์ได้ถูกต้องของนักเรียน

ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์

คำถามความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ พบว่าคำถามข้อที่นักเรียนชายตอบถูกน้อยที่สุด คือ “คนที่ดูสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีมีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้” ตอบถูกเพียงร้อยละ 14.8 ข้อคำถามที่ตอบถูกมากที่สุด คือ “การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งขณะมีเพศสัมพันธ์ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้” ตอบถูกมากถึงร้อยละ 90.8

คำถามที่นักเรียนหญิงตอบถูกน้อยที่สุดคือ “คนที่ดูสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีมีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้” ตอบถูกเพียงร้อยละ 10.2 คำถามที่ตอบถูกมากที่สุด คือ “การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งขณะมีเพศสัมพันธ์ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้” ตอบถูกมากถึงร้อยละ 91.3

ความรู้และความตระหนักเรื่องโรคเอดส์ตามตัวชี้วัด GARPR 5 ข้อ พบว่านักเรียนชายตอบถูกทั้ง 5 ข้อ ร้อยละ 13.9 ส่วนนักเรียนหญิงตอบถูกต้องทั้ง 5 ข้อ ร้อยละ 20.1

คำถาม	ชาย	หญิง
1.การมีคู่นอนเพียงคนเดียวที่เป็นผู้ไม่มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์และไม่มีคู่นอนคนอื่นลดเสี่ยง ในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้	66.5%	77.5%
2.การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งขณะมีเพศสัมพันธ์ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้	90.8%	91.3%
3.คนที่ดูสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีมีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้	14.8%	10.2%
4.คนติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้จากการถูกยุงกัด	85.2%	89.8%
5.คนติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้จากการกินอาหารร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์	46.1%	47.2%
6.โรคเอดส์เป็นแล้วรักษาให้หายขาดได้	69.9%	77.7%
7.ยาคุมฉุกเฉินใช้ป้องกันโรคเอดส์ได้	75.5%	86%
8.โรคเอดส์สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน	52.1%	55.9%
9.การล้างอวัยวะเพศหลังจากการมีเพศสัมพันธ์ป้องกันการติดเชื้อเอดส์ได้	48.7%	63.9%
ตอบข้อที่1 – 5 ได้ถูกต้อง	13.9%	20.1%
ตอบข้อที่1 – 9 ได้ถูกต้อง	5.2%	6.2%

