

ผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อมูลทั่วไป

การเฝ้าระวังในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ดำเนินการเก็บข้อมูลในกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๘๙๑ คน เป็นเพศชาย ๒๙๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๑ เพศหญิง ๕๙๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๙ อายุเฉลี่ย เพศชาย ๑๖.๙ ปี เพศหญิง ๑๖.๙ ปี

ประสบการณ์ทางเพศ

นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ และนักเรียนหญิงจำนวน ๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๕ เคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว อายุเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก เพศชาย ๑๕.๒๔ ปี เพศหญิง ๑๕.๗ ปี การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก เพศชายร้อยละ ๒ เพศหญิงร้อยละ ๐.๒ ของนักเรียนที่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว

ประสบการณ์ทางเพศในรอบปีที่ผ่านมา

นักเรียนชายมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมาร้อยละ 8.8 และเพศหญิงร้อยละ 4.9 การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด เพศชายร้อยละ 59.5 เพศหญิงร้อยละ 66.7 ของนักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์ในรอบปี

ประสบการณ์ทางเพศในรอบปีที่ผ่านมา	ชาย	หญิง
มีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา	8.8%	4.9%
ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด	59.5%	66.7%
มีเพศสัมพันธ์และดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด	2.4%	0.2%
มีเพศสัมพันธ์และใช้สารเสพติด ก่อนมีเพศสัมพันธ์	0%	0%
มีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับเงินหรือสิ่งของ	0%	0.2%

ประสบการณ์ทางเพศในรอบปีที่ผ่านมา แยกคู่นอน	ชาย	หญิง
มีเพศสัมพันธ์กับหญิงขายบริการ	10.8%	0%
ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง	5.4%	0%
ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด	5.4%	0%
มีเพศสัมพันธ์กับแฟนหรือคนรัก	35.1%	39.4%
ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง	24.3%	9.1%
ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด	29.7%	9.1%
มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย	2.7%	0%
ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง	0%	0%
ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด	0%	0%

วิธีการป้องกันการตั้งครรภ์

นักเรียนชายส่วนใหญ่ใช้วิธีป้องกันการตั้งครรภ์ โดยการใช้ถุงยางอนามัยชาย ร้อยละ 50 รองลงมา ใช้

การป้องกันการตั้งครรภ์	ชาย	หญิง
ใช้ถุงยางอนามัยชาย	50%	58.6%
ใช้ถุงอนามัยสตรี	3.8%	0%
ใช้ยาฉีดคุมกำเนิด	0%	6.9%
ใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด	3.8%	27.6%
ใช้ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน	11.5%	31%
นับระยะปลอดภัย	0%	6.9%
หลั่งภายนอก	7.7%	13.8%

ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน ร้อยละ 11.5 นักเรียนหญิงส่วนใหญ่ใช้วิธีป้องกันการตั้งครรภ์ คือ ถุงยางอนามัยชาย ร้อยละ 58.6 รองลงมาใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด ร้อยละ 27.6

พฤติกรรมการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ในรอบปีที่ผ่านมา นักเรียนชายมีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มากที่สุด คือ มีอาการปัสสาวะแสบขัด ร้อยละ 3.1 รองลงมา คือ แผลที่อวัยวะเพศ และมีตุ่ม/ก้อน/หูดที่อวัยวะเพศ ร้อยละ 1.4 เท่ากัน ส่วนนักเรียนหญิงมีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มากที่สุด คือ มีอาการปัสสาวะแสบขัดร้อยละ 2.9 และมีตุ่ม/ก้อน/หูดที่อวัยวะเพศ ร้อยละ 1.2

อาการทางเพศสัมพันธ์	ชาย	หญิง
มีอาการปัสสาวะแสบขัด	3.1%	2.9%
มีของเหลวที่ผิดปกติไหลออกจากอวัยวะเพศ	0.3%	0.3%
มีหนองไหลออกจากอวัยวะเพศ	0%	0.3%
มีหนองไหลออกจากทวารหนัก	0%	0%
แผลที่อวัยวะเพศ	1.4%	0.5%
แผลที่ทวารหนัก	0%	0.2%
มีตุ่ม/ก้อน/หูดที่อวัยวะเพศ	1.4%	1.2%
มีตุ่ม/ก้อน/หูดที่ทวารหนัก	0.3%	0.2%

ส่วนใหญ่ไปโรงพยาบาล/คลินิกตรวจโรคทั่วไปของรัฐ นักเรียนชายร้อยละ 1.4 นักเรียนหญิง ร้อยละ 2.7

การรักษา	ชาย	หญิง
ไปโรงพยาบาล/คลินิกตรวจโรคทั่วไปของรัฐ	1.4%	2.7%
ไปโรงพยาบาล/คลินิกตรวจโรคทั่วไปของเอกชน	0.3%	0.3%
ไปคลินิกกามโรคของเอกชน	0%	0.3%
ไปคลินิกกามโรคของรัฐ	0.7%	0%
ไปพบ พยาบาลประจำโรงเรียน	0%	0%
ซื้อยากินเอง	0.3%	0%
ปล่อยไว้ไม่ทำอะไรเลย	3.1%	1.7%

การตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี/เอดส์

นักเรียนชายที่เคยเจาะเลือดตรวจหาเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ร้อยละ 5.4 รู้ผลการตรวจเลือดร้อยละ 0.7
 นักเรียนหญิงที่เคยเจาะเลือดตรวจหาเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ร้อยละ 5.1 รู้ผลการตรวจเลือดร้อยละ 0.3

การตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี/เอดส์	ชาย	หญิง
เคยตรวจเลือด (yvct)	5.4%	0.7%

การตรวจเลือดและรับรู้ผลในรอบปี (KNVCT)	5.1%	0.3%
--	------	------

การตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคเอดส์ได้ถูกต้องของนักเรียน ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์

คำถามความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ พบว่าคำถามข้อที่นักเรียนชายตอบถูกน้อยที่สุด คือ “คนที่ดูสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีมีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้” ตอบถูกเพียงร้อยละ 24.4 ข้อคำถามที่ตอบถูกมากที่สุด คือ “การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งขณะมีเพศสัมพันธ์ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้” ตอบถูกมากถึงร้อยละ 86.8

คำถามที่นักเรียนหญิงตอบถูกน้อยที่สุดคือ “คนที่ดูสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีมีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้” ตอบถูกเพียงร้อยละ 20.3 คำถามที่ตอบถูกมากที่สุด คือ “การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งขณะมีเพศสัมพันธ์ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้” ตอบถูกมากถึงร้อยละ 94.6

คำถาม	ชาย	หญิง
1.การมีคู่นอนเพียงคนเดียวที่เป็นผู้ไม่มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์และไม่มีคู่นอนคนอื่นลดเสี่ยง ในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้	86.8%	87.4%
2.การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งขณะมีเพศสัมพันธ์ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้	97.3%	94.6%
3.คนที่ดูสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีมีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้	24.4%	20.3%
4.คนติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้จากการถูกยุงกัด	75.6%	79.7%

5.คนติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้จากการกินอาหารร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์	52.9%	52.3%
6.โรคเอดส์เป็นแล้วรักษาให้หายขาดได้	77.3%	79.2%
7.ยาคุมฉุกเฉินใช้ป้องกันโรคเอดส์ได้	88.1%	93.1%
8.โรคเอดส์สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน	58.6%	57%
9.การล้างอวัยวะเพศหลังจากการมีเพศสัมพันธ์ป้องกันการติดเชื้อเอดส์ได้	62.4%	70.5%
ตอบข้อที่1 – 5 ได้ถูกต้อง	27.8%	26.8%
ตอบข้อที่1 – 9 ได้ถูกต้อง	13.6%	12.6%

ความรู้และความตระหนักเรื่องโรคเอดส์ตามตัวชี้วัด GARPR 5 ข้อ พบว่านักเรียนชายตอบถูกทั้ง 5 ข้อ ร้อยละ 27.8 ส่วนนักเรียนหญิงตอบถูกต้องทั้ง 5 ข้อ ร้อยละ 26.8