# แนวทางการดูแลผู้ป่วยเชื้อดื้อยา เครือข่ายจังหวัดสตูล

ผู้ป่วย D/C จากรพ.สตูล

D/C กลับบ้าน ไม่ผ่าน รพช.
- แจ้งข้อมูลผ่าน line group IC
- แจ้งผ่าน ICN รพช. ทางโทรศัพท์โดยตรง
- แสดงสัญลักษณ์/สติกเกอร์เชื้อดื้อยา

รพช.
- แจ้งข้อมูลผ่าน line group IC
- แจ้งผ่าน ICN ทางโทรศัพท์โดยตรง
- มีเอกสารแนบ/ใบรีเฟอร์
- สัญลักษณ์/สติกเกอร์เชื้อดื้อยา

ผู้ป่วยมาเอง

- เข้าจุดคัดกรอง/ซักประวัติ OPD / ER ในเวลา/นอกเวลา
- เข้าสู่ระบบการเฝ้าระวังของ รพ.

ICN แจ้ง ผู้รับผิดชอบงาน รพ.สต.

ทำหัตการ/ฉีดยา ATBต่อเนื่อง

- แยกZone ผู้ป่วย
- ใช้ standard/contact precaution
- ให้ความรู้ผู้ป่วย/ญาติ
- ติดป้ายเตือน/แสดงสัญลักษณ์/สติกเกอร์เชื้อดื้อยาเพื่อเตือนให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ

ผู้ป่วย Admit

- แยก zone ผู้ป่วย
- ใช้ standard/contact precaution
- ให้ความรู้ผู้ป่วย/ญาติ
- ติดป้ายเตือน/แสดงสัญลักษณ์/สติกเกอร์เชื้อดื้อยาเพื่อเตือนให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ

ผู้ป่วย D/C

- ส่งข้อมูลต่อทางระบบ line / แจ้งโดยตรงแก้ผู้รับผิดชอบ รพ.สต. เอกสารแนบพร้อมสัญลักษณ์ ระบุระยะเวลาที่เฝ้าระวัง